douted wind intendented

Touriga Brasileira

Vass7R03s366-370



FINA Collection Vassal-Montpellier

1483Mtp12

Lowed Brain Cina Main

Touriga brasilevia n 4 R 3 s 366.370









ANNEE 1990

NOM Touriga brasileira, EMPLACEMENT 7R3 5,366,370 ...

Souche	Nore yeux		Débourrement Nbre Ferti- Floraison début mi/déb grap lité début mi/f fin					Véraison début mi/v fin Matu			Maturité	
3 } 4 } 5			153. 90		30		17.5	23,-5	18,7	23.7	30,7	20 =8,90 +2

Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: 1 euge Vigueur: 2

NOM Touriga browlera EMPLACEMENT 7 R3 A 366. 370

Souther Whre Débourrement Nore Perti Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 2 18.3 M.3* 2 8 30.5 2.6 4.6 30.7 5.8 13.8 19.8 +12

1 4 Crapte: G M B Dim: 12 Compacité: L - M C Pour: O Mill: O Mill

alantealantealantudantud

N° d'ordre: 148312 Fouriga Brasileira
Désignation: 7R3.8,366-370 (0.5)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 100) - sans villosité pubescente 278 - sans villosité Laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé od cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Stalees - en gouttière - autres.

Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité subescante 180 - sans villosité laineuse 281.

Face supérioure : blanches 203 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à Pasété carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 encièrement bronzées ou cui mées 211 - vertes 212 autres 213.

Dans le cas cu la pramière feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 22me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Porc intérioure

Terrures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 2/17 duveteux 218 - cotonneux 213 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

mimpo : glabro 229 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (2) - cotonneux 225 - sans villesité pubescente 284 sans villositá laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Tace surérieure

Mlanc 226 - fauve or roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 23).

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 287 duweteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans millosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

daatadaatadaalaatadaatad

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Fouriga Brasileira 7R30-366-370.0.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre colorá 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

· Calno 90

N° d'ordre: Touriga Brasileira
Désignation:
Emplacement: 7R3 p - 366-370 p - 5

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéoux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo89

Fouriga Brasileira 7 R3 s. 366.370 (6.5) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (70) (dimensions 11 x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73, A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 /- mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81 Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 4 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent, A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121/. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125/ - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29]. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (3) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 89

DENOMINATION :

٧4

Fouriga Brasileira moin 7 R3 s-366-370 s.5

alantanhantarihantanhantand

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grâle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Morithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - 2 raies (2) - 3 bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) - effacé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

- Calvo 40

N° d'ordre: 1964.08

Désignation: Touriga brasileira w

Emplacement: 7 R3 S 366.370

: 1 - (2) - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L1/Ly : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - 26 - (27) - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62: (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 32